

***Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837) Pipistrello di Savi**

Misure – Lunghezza del corpo (40) 43-52 (54) mm; Lunghezza della coda 31-43 mm; Avambraccio 30-37 (38) mm; Apertura alare 220-250 mm; Peso 5-10 g.

Ecologia – Si trova in ambienti di vario tipo dove seleziona come rifugio gli interstizi nelle rocce, talora nelle cavità ipogee, le cavità arboree e gli spazi sotto le cortecce. È una delle specie più comuni in ambiente urbano dove, in vicinanza dei rifugi naturali, occupa gli interstizi presenti negli edifici. È specie sedentaria ma come le altre specie di Chiroteri compie spostamenti tra i rifugi estivi e quelli invernali con un record documentato di 250 km. Si nutre di piccoli insetti quali Ditteri, Lepidotteri, Imenotteri e Neuroteri che cattura in volo. Le femmine partoriscono due piccoli, raramente uno, tra giugno e luglio.

Distribuzione – Entità centroasiatico-mediterranea, diffusa in Europa meridionale (area mediterranea), parte dell'Europa centrale e orientale, Africa nord-occidentale, Asia centrale e a Est, fino all'India nordorientale e, forse, al Giappone settentrionale.

Tutte le regioni italiane sono comprese nell'areale della specie.