

***Myotis capaccinii*** (Bonaparte, 1837) **Vespertilio di Capaccini**

Misure – Lunghezza del corpo (49) 55-64 mm; Lunghezza della coda (21) 23-29 (32) mm; Avambraccio (46) 49-54 (55) mm; Apertura alare 310-340 mm; Peso 10-18 g.

Ecologia – Predilige le zone umide, siano esse caratterizzate da vegetazione arborea o arbustiva, poiché caccia sugli specchi d'acqua e sulla vegetazione ripariale. Iiberna in cavità naturali e artificiali, raramente in scantinati, mentre per i parti le femmine si riuniscono a formare le *nursery* (colonie riproduttive) nelle grotte. È specie generalmente sedentaria ma può compiere spostamenti considerevoli tra i rifugi estivi e quelli invernali. Si nutre principalmente di Ditteri, Neuroteri e Tricotteri ma nella sua dieta è stata rilevata la presenza anche di Ditteri allo stadio larvale e di piccoli pesci. Le femmine danno alla luce un unico piccolo di regola in giugno.

Distribuzione – Entità centroasiatico-mediterranea, diffusa nell'Europa mediterranea, nell'Africa maghrebina e, in Asia sud-occidentale, fino all'Iran e all'Uzbekistan.

L'areale comprende tutte le regioni italiane.