

Myotis dasycneme* (Boie, 1825) *Vespertilio dasycneme

Misure – Lunghezza del corpo 57-68 (73) mm; Lunghezza della coda (39) 46-51 (53) mm; Avambraccio (41) 44-48,5 (49,2) mm; Apertura alare 200-320 mm; Peso (11) 14-20 (23) g.

Ecologia – Predilige le aree boscate e le zone umide con specchi d'acqua ma frequenta anche le aree fortemente antropizzate. In inverno iberna in grotte, miniere o scantinati, ma anche in alberi cavi, mentre in estate utilizza come siti di rifugio le parti alte degli edifici, le cavità arboree e le cassette-nido. Specie regolarmente migratrice con spostamenti documentati fino a 330 km. Si nutre di piccoli Ditteri, Lepidotteri e Coleotteri che cattura in volo. Le femmine partoriscono di regola un unico piccolo tra maggio e luglio.

Distribuzione – Entità centroeuropea-siberica, con limite occidentale nella Francia nord-orientale, limite settentrionale in Svezia meridionale ed Estonia, fino alla Siberia centrale, con una segnalazione isolata in Manciuria.

In Italia esiste un'unica segnalazione storica per la città di Trento dove una femmina è stata catturata nel 1881 ed è tuttora conservata presso il Museo "La Specola" di Firenze.