

***Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817) Vespertilio di Daubenton**

Misure – Lunghezza del corpo (40) 45-55 (60) mm; Lunghezza della coda (27) 31-44 (48) mm; Avambraccio 33-41 (42) mm; Apertura alare 240-275 mm; Peso (4) 7-10 (17) g.

Ecologia – Frequenta sia gli ambienti forestali sia i centri abitati purchè prossimi ai suoi territori elettivi di caccia, ossia le zone umide. Sverna in ambiente ipogeo mentre i rifugi estivi sono rappresentati da cavità arboree, cassette nido, edifici, con casi di individui rinvenuti in nidi di Topino e fra le pietre accumulate sui pavimenti delle cavità naturali. La specie è migratrice parziale, con spostamenti tra i quartieri estivi e quelli invernali inferiori ai 100 km, sebbene sia stato documentato uno spostamento di 260 km. Si nutre prevalentemente di Ditteri Chironomidi ma nella sua dieta è stata riscontrata anche la presenza di piccoli pesci. Le femmine partoriscono un unico piccolo tra la seconda metà di giugno e luglio.

Distribuzione – Entità asiatico-europea, diffusa in tutta Europa, in Asia fino al Giappone, con limite settentrionale intorno ai 60° di latitudine e meridionale fino ai 45° a occidente e ai 25° a oriente.

Tutte le regioni italiane sono comprese nell' areale.