

***Nyctalus noctula*** (Schreber, 1774) **Nottola comune**

Misure – Lunghezza del corpo 60-84 (88) mm; Lunghezza della coda (38) 41-60,6 mm; Avambraccio (45) 48-58,5 mm; Apertura alare 320-400 mm; Peso (16,7) 19-40 (46) g.

Ecologia – Specie forestale come la Nottola di Leisler, frequenta tuttavia anche gli abitati utilizzando gli edifici come rifugio in vicinanza delle cavità arboree. Può trovarsi inoltre nelle cassette-nido e negli interstizi di infrastrutture quali ponti e pali cavi in cemento. È una specie migratrice che copre in media distanze comprese tra 900-1.600 km con uno spostamento record di 2.347 km. Si nutre prevalentemente di Tricotteri, Ditteri, Lepidotteri e Coleotteri che cattura in volo. Le femmine partoriscono di norma due piccoli tra giugno e luglio, raramente possono dare alla luce un unico piccolo ed eccezionalmente tre.

Distribuzione – Entità centroasiatico-europea, segnalata in tutta Europa fino a circa il 60° parallelo, nell'Africa maghrebina e in Asia: Vicino Oriente, Turkmenistan, Siberia sud-occidentale, regioni himalayane, Giappone e a parte della Regione Orientale (Cina meridionale, Vietnam settentrionale e, forse, Thailandia settentrionale e Penisola Malese).

In base alle segnalazioni disponibili per l'Italia si può supporre che la specie sia presente in tutte le regioni, tranne in Sardegna e Sicilia.