

Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1818) *Pipistrello albolimbato

Misure – Lunghezza del corpo 40-47 (50) mm; Lunghezza della coda 30-40 mm; Avambraccio 31-36 (37) mm; Apertura alare 210-240 mm; Peso 5-10 g.

Ecologia – Frequenta svariati tipi di ambiente ed è il chiroterro più comune negli abitati. Si rifugia negli interstizi delle costruzioni antropiche (cassonetti delle persiane, fessure dei muri, spazi dietro i frontalini metallici e altri interstizi), nelle cassette-nido e in fessure artificiali di cave e miniere (fori di mina), che rappresentano il corrispettivo dei suoi rifugi naturali, ossia fessure nelle rocce e cavità arboree. È specie probabilmente sedentaria. Si nutre di piccoli insetti tra i quali Ditteri, Lepidotteri, Tricotteri e Coleotteri. Le femmine partoriscono due piccoli, raramente uno, tra giugno e luglio.

Distribuzione – Specie turanico-mediterranea, diffusa in Europa meridionale e centro-meridionale (limite Nord in Francia; segnalazioni sporadiche in Germania e Gran Bretagna), Africa settentrionale e orientale, Asia meridionale, con limite orientale nell'India nord-orientale.

Tutta l'Italia è inclusa nell'areale della specie.