

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) **Pipistrello di Nathusius**

Misure – Lunghezza del corpo (42,2) 46-56 (58) mm; Lunghezza della coda (30) 33-40 (44,6) mm; Avambraccio 31-37 mm; Apertura alare 220-250 mm; Peso 6-15,5 g.

Ecologia – Predilige gli ambienti forestali, in particolare di latifoglie, mantenendosi nella fascia marginale di questi e frequentando anche i parchi urbani. Gli ibernacoli e i rifugi estivi sono rappresentati da cavità arboree e da edifici, inoltre può svernare in fessure nella roccia e in estate rifugiarsi in cassette-nido. È specie migratrice con uno spostamento record documentato di 1.905 km. Si nutre catturando in volo piccoli insetti tra i quali Ditteri, Lepidotteri, Tricotteri e Coleotteri. Le femmine partoriscono di norma due piccoli, raramente uno, tra giugno e luglio.

Distribuzione – Specie turanico-europea, distribuita in Europa, in prevalenza in Europa centrale, con limite settentrionale nella Scozia e nella parte più meridionale della Finlandia, Asia Minore e Transcaucasia.

In Italia in base alle segnalazioni si ritiene possibile la sua presenza in tutte le regioni centro-settentrionali, al Sud è più scarsa o forse scomparsa, mentre non è mai stata rilevata in Sardegna e Sicilia.